

Informationen zur Behandlung mit Leflunomid

(z. B. Arava®)

1. Dosierung:

20 mg/d (Einnahme zu jeder Tageszeit und unabhängig von Mahlzeiten möglich, z.B. morgens)

2. Mögliche unerwünschte Wirkungen:

1. Durchfall (Übelkeit)
2. Anämie, Leuko-, Thrombopenie, Agranulozytose
3. Hypertonie
4. Verzögerte Regeneration in Haut und Schleimhäuten (Dermatitis, Alopezie)
5. Transaminasen-, Kreatininanstieg
6. Infekte

3. Erforderliche Kontrolluntersuchungen:

Woche 0, 2 und 4 nach Therapiebeginn; - Rotes Blutbild, Leukozyten mit Differenzierung,
danach alle 8 Wochen: Thrombozyten, ALT, AP, γ GT, Bilirubin,
Kreatinin

Regelmässige Blutdruckkontrollen erforderlich.

Zu beachten:

Bei Abfall der Gesamtleukozyten unter 2.5 G/L oder Granulozyten unter 1.5 G/L, der Lymphozyten unter 80'000 μ l und/oder Thrombozyten unter 80'000/ml absolut bzw. um mehr als 100'000, Anstieg der Transaminasen über mehr als das Dreifache bitte Rücksprache – Zu Beginn Durchfallphase möglich, meist reversibel. Grund zum Absetzen nur bei Persistenz oder starker Ausprägung. Im Zweifelsfall bitte Rücksprache.