

Informationen zur Behandlung mit Mycophenolat-Mofetil

(z. B. CellCept[®] bzw. Myfortic[®])

1. Dosierung:

CellCept: initial 2 x 500 mg/d, nach 1 Woche Steigerung auf Erhaltungsdosis 2 x 1000 mg/d
Myfortic: initial 2 x 360 mg/d, nach 1 Woche Steigerung auf Erhaltungsdosis 2 x 720 mg/d

2. Mögliche unerwünschte Wirkungen:

1. Diarrhö, Nausea, Obstipation, Übelkeit
2. Bauchschmerzen, Hepatitis
3. Leukopenie, Thrombopenie, Anämie, Leukozytose
4. Angst, Depression
5. Schwindel, Schlafstörung, Tremor, Kopfschmerzen
6. Hyper-, Hypotonie, Herzrhythmusstörungen
7. Husten, Dyspnoe, Pleuraerguss
8. Rückenschmerzen
9. Verschiedene Hautreaktionen
10. Infekte inkl. Sepsis

3. Erforderliche Kontrolluntersuchungen:

Woche 0, 2 und 4 nach Therapiebeginn:

Rotes Blutbild, Leukozyten mit Differenzierung,
Thrombozyten, ALT, AP, γ GT, Bilirubin, Kreatinin

Im Anschluss Wiederholung alle 8 Wochen

Zu beachten:

- Einnahme vor den Mahlzeiten und im Abstand von 2 h zu Antazida und Eisenpräparaten.
Vermehrter Myelotoxizität bei gleichzeitiger Einnahme von ACE Hemmern.
- Bei Abfall der Gesamtleukozyten <3 G/l, der Granulozyten <2 G/l, der Lymphozyten <0.5 G/l, der Thrombozyten $<100.000 \mu$ l, Auftreten einer Anämie oder bei Anstieg der Transaminasen über das 2–3fache der Norm bitte Rücksprache.