

Informationen zur Behandlung mit Sulfasalazin (Salazopyrin[®], Salazopyrin EN[®])

1. Dosierung:

Die Behandlung erfolgt einschleichend bis zu einer Erhaltungsdosis von 2 g/d:

- **1. Woche:** 1'000 mg täglich (1-0-1)
- **ab 2. Woche:** 2'000 mg täglich (1-0-1)

2. Mögliche unerwünschte Wirkungen:

1. Bauchschmerzen, Übelkeit, Geschmacksstörungen
2. Kopfschmerzen, Schindelgefühl, Tinnitus
3. Oligospermie und Infertilität
4. Exanthem, Photosensibilisierung, Alopezie, Stomatitis
5. Leuko-Thrombozytopenie, aplastische oder hämolytische Anämie (Methämoglobinämie)
6. Proteinurie, Hämaturie
7. Cholestase, Hepatitis, Transaminasenanstieg, Pankreatitis

3. Erforderliche Kontrolluntersuchungen:

Woche 0, 2 und 4:

- Rotes Blutbild, Leukozyten mit Differenzierung, Thrombozyten
- ALT, AP, γ GT, Bilirubin, Lipase
- Kreatinin und Urinstatus

Danach Wiederholung alle 8 Wochen